

バラの年間管理表

この度は、バラのお買い上げありがとうございます。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
バラの状況		成長＆開花期									休眠期（落葉時期）		
水やり	地植え	週に1～2回程度			乾いたらタップリ（毎日）			週1～2回		月に1～2回程度			週1～2
	鉢植え	表面が乾いたら、鉢底から出るくらいタップリ（夏は毎日、朝・夕方の2回が理想です）											
施肥	※与え過ぎ				春・秋の花後にお礼肥え（剪定後や花がら摘み後）						寒肥え（油かす等） ※芽が伸びてきたら、		
剪定・誘引	四季咲き（木バラ）			花がら摘み		夏の剪定		つるバラでも、 四季咲き品種は 木バラ同様に剪			冬の剪定 （強剪定は2月）		
	つるバラ			つるバラの場合 シュートの整理 （誘引など）も		枝の整理					つるバラの場合 枝の誘引もこの		
病虫害	病気	ウドンコ病（葉に白い粉）				ウドンコ病				早期発見・早期治療が効果的			
		黒点病（葉に黒い斑点）				黒点病							
		ベト病											
	害虫	アブラムシ・シャクトリムシ・ヨトウムシなど（暖かい時期に出没）											
		チュウレンジバチ（新芽付近注意！）						どのような薬品が良いかは、 薬品販売店でご相談下さい					
		ハダニ（葉の裏側に付きます）											
		カミキリムシ ※産卵期 （株元に穴を開けます）											
	消毒	殺菌剤・消毒薬などを適時散布する（午前の散布が良い） ※バラ生育期は病虫害が出やすい時期。害虫は春～夏に出やすく、 病気は昼夜の気温差の大きい時期や梅雨時期は要注意！									石灰硫黄合剤 （剪定後が理想）		

病虫害の早期発見と対処方法

ウドンコ病・・・葉の表面に粉がかかったように白くなってきたら、殺菌剤を3～5日の間に2回続けて散布。早い段階での散布が効果あり！

黒点病・・・泥はねに注意（雑な水やりや雨後に出やすい）

ベト病・・・黒点病との見分け方は、葉の裏側に小さい胞子が付いている事。
昼夜の気温差が、10度以上の時のみ出やすい（春と秋）

ハダニ・・・効果UPの裏技　ハダニ用の薬剤に木酢液（1000倍程度）を混ぜて散布する。

チュウレンジバチ・・・つぼみが出てからの雨上がりの朝に出没。
バラクキバチ　早朝に簡単な殺虫剤散布で対処可能。